

Gavilán bicolor, azor variado

Reino: **Animalia**
Filum: **Chordata**
Subfilum: **Vertebrata**
Clase: **Aves**
Orden: **Falconiformes**
Familia: **Accipitridae**
Especie: *Accipiter*
bicolor



División de Ambiente
Centro de Información Ambiental de la
Cuenca (CIAC)

Descripción

El gavilán bicolor es un ave de rapiña de tamaño mediano, esbelto y elegante. Los machos miden de 32 a 36 cm de largo, pesan de 205 a 260 g y tienen una envergadura de 62 a 65 cm. Las hembras son más grandes, midiendo 40 a 46 cm, un peso de 370 a 450 g y envergadura de 68 a 72 cm.

Tiene las alas relativamente cortas y redondeadas, con las plumas primarias puntiagudas que se extienden hacia fuera como dedos. La cola es bastante larga con la punta redondeada.

La coloración tanto en machos como hembras, es similar. Los adultos son



negro azulado por encima, más oscuro en la corona. La cara es gris oscura, los ojos naranja o rojizos, el cere amarillo. El pico es negro, corto y ganchudo. La garganta es blanco-grisácea. Pecho y abdomen gris ceniza, con finas rayas más oscuras. Parte inferior del vientre blancuzca, los muslos rojizos, patas amarillo-verdosas, garras negras. La cola es gris oscura con 3 o 4 franjas transversales negras.

Los individuos inmaduros por encima son café o pardo oscuro, más oscuro en

la cabeza, y con una banda más clara en la nuca. Por debajo blanquecinos con listas entre café y negruzcas, a veces con un barreteado disparejo en los costados. Los muslos son rojizos, las patas amarillas y las uñas café. Los lados de la cabeza a veces con listones en negro. El cere es amarillo claro o crema, el iris es amarillo. Cola más clara que en el adulto, por lo que son más notorias las franjas oscuras.

Distribución y Hábitat

Ave natural del continente americano, ampliamente extendido por el Neotrópico, encontrándose desde el sur de México, pasando por Panamá y por toda Suramérica, hasta la Tierra del Fuego, con excepción de los desiertos costeros peruanos y chilenos. Se le documenta desde el nivel del mar hasta los 2700 m de elevación.

Habita tanto en bosques húmedos como en los deciduos, bosques ribereños densos, en bosques alterados, crecimientos secundarios, rastrojos y parches boscosos en medio de las savanas y áreas de cultivo.

Se reconocen 4 subespecies: *A. b. bicolor*, desde suroeste de México, toda Centroamérica, hasta el noroeste de Perú, este de Bolivia, norte de Brasil y las Guayanas; *A. b. fidens*, este y sureste de México; *A. b. pileatus*, Brasil, sureste de la Amazonia brasileña, Uruguay y noreste de Argentina; y, *A. b. guttifer*, suroeste de Brasil y Bolivia, hasta Paraguay y el noroeste de Argentina.

En Panamá, la subespecie *A. b. bicolor* es relativamente común hacia el occidente del país, tanto hacia el Caribe como el Pacífico. En el este de la península de Azuero y sur de Coclé está ausente, aunque hay algunos reportes en el PN Cerro Hoya. Se le observa con mucha regularidad en la Isla de Coiba. Se le encuentra también en la comarca Guna Yala, el este de la provincia de Panamá y el PN Darién. En la Cuenca del Canal de Panamá aunque hay pocos reportes, sí se le ha visto en la Isla de Barro Colorado y los PN Soberanía y Chagres.

Alimentación y Hábitos

Es un hábil cazador. Su alimentación consiste principalmente en otras aves, pero pueden complementar su dieta con pequeños mamíferos, lagartijas e insectos. Caza a todos los niveles del bosque, desde la parte más baja del sotobosque hasta el dosel, tanto de bosques vírgenes como intervenidos, en bordes del bosque, o matorrales altos. Sus alas relativamente cortas y redondeadas le permiten desplazarse con gran habilidad entre la vegetación.



Espera a su presa silenciosamente entre un escondite denso y se le lanza sobre ella con rapidez. En el dosel puede volar velozmente entre las ramas a manera de rápido reconocimiento y luego persigue a cualquier presa que se haya espantado. Se le ha visto atacar a grupos de aves que se están alimentando en árboles cargados de frutos. De vez en cuando se aventura a las áreas abiertas y ataca polluelos de palomas y otras

aves, así como pequeños roedores.

Es muy valiente y se atreve a encarar a gavilanes más grandes si estos se acercan mucho a sus nidos.

Reproducción

Es un ave sedentaria, que vive solitaria luego de abandonar su nido. Cuando llega a la edad adulta forma parejas estables, es decir que es monógama.

El nido es una pequeña plataforma en forma de copa, construido con ramitas largas y delgadas, con tramado firme y un forro de pasto seco o musgo muy bien tejido. Mide alrededor de 60 cm de ancho y los hacen en ramas individuales, en bifurcaciones, en lianas, o sobre plantas epífitas, generalmente en los árboles más elevados, en el interior del bosque, a cierta distancia de la orilla, para evitar a los depredadores.

La puesta usual es de 2 a 4 huevos, aunque excepcionalmente podrían ser 5 o 6. Son casi elípticos, de cáscara gruesa y lisa, de color blanco, o celeste claro. A veces con manchas amarillas o verduscas, ubicadas hacia el polo grueso del huevo.

Las hembras realizan la mayor parte de la incubación y protegen el nido, mientras que los machos traen alimento a la hembra y a los polluelos. El período de incubación toma de 33 a 37 días. Los jóvenes se valen por sí mismo a las 7 semanas, aunque algunos retornan de vez en cuando por los próximos días para que los padres le den algo de comer.

Estado de Conservación

A nivel mundial, la IUCN, en su revisión de 2008, la tiene clasificada como especie de preocupación menor (LC). Esto se debe a que, a pesar de que el tamaño de la población varía desde moderadamente pequeña a grande, atendiendo al grado de alteración del hábitat, se estima que no alcanza en ningún caso los umbrales de Vulnerable.

Es un ave usada como mascota y también es una de las preferidas en las competencias de cetrería. Se encuentra catalogada dentro del apéndice II de CITES.

En Panamá, se considera una especie poco común, y además que sus poblaciones van disminuyendo debido a la caza y a la tala de los bosques. Es por eso que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) la considera una especie vulnerable (VU). Está protegida por las leyes No. 24 de 1995 (Vida Silvestre), No. 5 de 2005 (Delitos Ambientales) y por la Resolución AG-0172-2004 de mayo de 2004 (Tráfico de especies de fauna y flora amenazadas y en peligro de extinción).

En otros países de América se encuentra protegida por las leyes de ambiente y de caza.

Referencias

1. <http://burica.wordpress.com/2008/05/14/especies-de-fauna-y-flora-amenazadas-y-en-peligro-de-extincion-en-panama/>
2. <http://www.anam.gob.pa>
3. http://www.avesderapinabrasil.com/accipiter_bicolor.htm
4. <http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search>
5. <http://www.planetofbirds.com/accipitriformes-accipitridae-bicolored-hawk-accipiter-bicolor>