

# Carancho

Reino: **Animalia**  
Filum: **Chordata**  
Subfilum: **Vertebrata**  
Clase: **Aves**  
Orden: **Falconiformes**  
Familia: **Falconidae**  
Especie: ***Caracara  
cheriway***



## Descripción

Es un ave de rapiña de tamaño mediano. Como en otras especies de este tipo, las hembras son de mayores proporciones que los machos. Ellos miden de 48 a 55 cm de largo, envergadura de hasta 1.0 m y pesan entre 0.8 y 1.2 kg. Ellas alcanzan hasta 69 cm de longitud, 1.2 m de envergadura y un peso de hasta 1.6 kg.

Su cuerpo es esbelto y caminan erguidos. En los adultos el color del tronco es café oscuro; en el pecho y en el lomo tienen barras blancas o amarillentas intercaladas con café; el cuello y las mejillas son crema o blancuzcas. La cabeza es de color castaño oscuro, con una corona de plumas que se extiende hacia atrás formando una corta cresta. Tienen un área de piel de color rojiza o naranja que cubre la cara y la mitad del pico, incluyendo el cere. El resto del pico es de color hueso o grisáceo. Las alas y dorso son café oscuro, casi negros; la cola es blanco amarillenta, con tenues líneas crema y con una banda café en la punta; las patas son amarillas o naranjas; uñas negras. En vuelo se ven 2 manchas blancas en las puntas de las alas.

Los juveniles son básicamente de color castaño claro con tenues estrías en canela, la corona café oscuro, las patas grises, el pico grisáceo y la cara rosada.

Tienen un pico grueso, robusto, con los orificios nasales a la mitad y fácilmente distinguibles. La mandíbula superior es más ancha, larga y curvada



CANAL DE PANAMÁ

División de Ambiente  
Centro de Información Ambiental de la  
Cuenca (CIAC)

hacia abajo, termina en una punta pronunciada en forma de gancho. Las patas son largas, aptas para caminar, y terminan en garras largas y ganchudas. Las alas son largas, anchas y rectangulares, con las plumas de las puntas separadas como los dedos de una mano.

### **Distribución y hábitat**

Es natural de las Américas. Se encuentra desde el sur de los Estados Unidos, por toda Centroamérica, hasta el norte de Brasil y Perú, así como en algunas islas del Caribe como: Cuba, Aruba, Islas Caimán y Trinidad y Tobago.



Sin embargo, esta distribución no es continua. Hay lugares donde su presencia es de común a abundante, mientras que en otros sitios es escasa a muy rara.

El hábitat preferido del caracaro son las zonas abiertas, como: pastizales, sabanas, playones a orillas de los ríos, potreros, caminos rurales, matorrales abiertos y áreas agrícolas. Es menos común en zonas boscosas y en pantanos. En algunas ocasiones se les ve en

vertederos de basura y muy poco se aventura a parques urbanos. Está presente desde el nivel del mar hasta los 2,600 metros de elevación.

En Panamá se encuentra con frecuencia en las tierras bajas de la vertiente del Pacífico, desde Chiriquí hasta el oeste de la provincia de Darién. Es muy raro verlo en la vertiente del Caribe, donde hay mayor cobertura boscosa. En la Cuenca del Canal es relativamente común en las áreas ganaderas que bordean el lago Gatún.

### **Alimentación y hábitos**

No es un depredador especializado, sino más bien generalista. Sus estrategias para la obtención de alimentos son muy variadas. A diferencia de otras aves rapaces, sus desplazamientos son más terrestres que aéreos.

Se alimenta principalmente de carroña, siendo común observarlo a lo largo de los caminos y carreteras para alimentarse de animales atropellados. En ocasiones se les puede ver junto a los gallinazos mientras comen de un animal muerto, pero de ser necesario, pelean contra ellos, ahuyentándolos. Caza también pequeños animales como lagartijas, serpientes, ranas, ratones, etc. Para esto se posa sobre un poste, un arbusto o sobre un peñasco hasta localizar a su presa; luego desciende a tierra, a cierta distancia de dicha presa, para después alcanzarla caminando o a veces corriendo. Ataca principalmente a los animales jóvenes o heridos. En períodos de escasez de comida, se les ha observado atacando a cerdos, terneros, corderos y cabritos recién nacidos, picoteándole los ojos, el ombligo y la región anal, aunque no hay certeza que les produzcan la muerte.

También puede atacar nidos de otras aves, comiéndose los huevos o los polluelos que hayan sido dejados sin vigilancia por sus padres. Escarba el suelo con sus garras en busca de semillas, frutos pequeños, lombrices y gusanos. Es hábil localizando nidos de tortugas y de iguanas, logrando desenterrar y comer los huevos más cercanos a la superficie. En ocasiones se le ve en los vertederos de basura, alimentándose de desechos orgánicos y de las larvas de insectos que proliferan entre los desperdicios. En los campos de labranza camina detrás de los tractores que están arando en busca de lombrices e insectos. Aprovecha cuando los animales en los potreros están descansando, se acerca a ellos y les quita las garrapatas.



El carancho tiene también otros hábitos alimenticios menos conocidos. Uno es caminar entre el fango en los manglares durante la marea baja en busca de crustáceos y pequeños peces. Otro es la piratería, ya que puede atacar a gaviotas y águilas pescadoras en vuelo, hasta obligarlas a soltar la presa, la cual luego atrapan antes que caiga a tierra.

Son principalmente sedentarios, muy territoriales, y se desplazan de acuerdo a la abundancia de alimento. Son solitarios, aunque pueden ser vistos en pareja o en pequeños grupos de 3 o 4 individuos, formados por los padres y los hijos juveniles Si encuentran un animal muerto de gran tamaño, podrían verse en grupos más numerosos mientras comen.

### **Reproducción**

Son generalmente monógamos, la unión de la pareja suele mantenerse por muchos años. Normalmente anidan en árboles altos, sin embargo, en áreas abiertas y perturbadas pueden elegir arbustos, matorrales o incluso peñascos enormes. El nido es voluminoso, con una estructura de ramas entretrejidas en forma de copa y el interior está cubierto con plumas, hierbas, lana de ovejas, pelos y otros materiales suaves. Puede medir 1 metro en diámetro, con una altura de 40 cm, y con ciertos retoques son usados durante varios años.

La nidada es de 2 a 3 huevos, raras veces 4, de color rojizo claro, manchados de castaño, midiendo de 54 a 59 mm. El periodo de incubación es de 28 a 32 días, durante los cuales ambos padres se turnan para incubar los huevos. Algunas parejas anidan por segunda vez durante el mismo año, en estos casos la nidada es de 1 a 2 huevos. Las crías empluman a las 7 u 8 semanas y empiezan a volar como aves independientes a los 3 meses.

### **Estado de conservación**

El carancho es considerada como vulnerable en Panamá, aparece en el listado nacional de especies amenazadas y endémicas (Resolución No. AG 51-2008). Esta consideración se debe entre otras cosas, a la pérdida de hábitat, ya que muchas zonas de llanuras y matorrales, están

siendo urbanizadas. Además, en algunas zonas los criadores de aves de corral los matan, porque los consideran una amenaza. También, en forma global está protegido por otras normas: la Ley No. 24 de 1995 (Vida Silvestre), la Ley No. 39 de 2005 (Permisos de cacería y sanciones) y la Ley No. 5 de 2005 (Delitos Ambientales).

Está considerada como una especie de Menor Preocupación (LR) por la UICN. Se encuentra en el Apéndice II de CITES, lo que indica que es una especie que aunque no está en peligro inminente, podría estarlo si no se controla su cacería.

### Otros datos

Hasta hace unos años, había sólo una especie reconocida, *Polyborus plancus*, pero recientemente fue dividida en 2 especies, las cuales fueron trasladadas al género *Caracara*. Las 2 especies son ahora: el carancho del norte (*Caracara cheriway*), cuya distribución ya se mencionó arriba, y el carancho del sur (*Caracara plancus*), que habita desde la región del Amazonas hasta la Tierra del Fuego. Ambas especies conviven en la región del río Amazonas.

Otros nombres comunes con que se conoce a esta especie en Panamá son: caracara crestado, caracara frentirrojo, garrapatero.

### Referencias

1. Burica Press Panamá. 2008. En línea: <http://burica.wordpress.com/2008/05/14/especies-de-fauna-y-flora-amenazadas-y-en-peligro-de-extincion-en-panama/>.
2. Sociedad Audubon de Panamá. 2010. Lista de las aves de Panamá.
3. Méndez, Pedro et. al. 2006. Las aves rapaces: Guía didáctica de educación ambiental. Fondo Peregrino - Panamá.
4. [http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Caracara\\_cheriway/](http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Caracara_cheriway/)
5. <http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/falconidae/caracara/plancus/index.htm>
6. <http://www.cites.org/eng/app/appendices.php>
7. <http://www.jumara.com.ar/index.php?especie=64>
8. <http://www.waza.org/es/zoo/visitar-el-zoologico/ave-de-rapina-1263308238/caracara-plancus>
9. <http://www.fotonatura.org/galerias/fotos/479035/>