

Carancho

Reino: **Animalia**
Filum: **Chordata**
Subfilum: **Vertebrata**
Clase: **Aves**
Orden: **Falconiformes**
Familia: **Falconidae**
Especie: ***Caracara
cheriway***

Descripción

Es un ave de rapiña de tamaño mediano, de cuerpo esbelto, con caminar erguido y elegante.

Como en la mayoría de las especies de caza, las hembras son de mayor tamaño que los machos. Ellos miden de 48 a 55 cm de largo, envergadura de hasta 1.0 m y pesan entre 0.8 y 1.2 kg. Ellas alcanzan hasta 69 cm de longitud, 1.2 m de envergadura y un peso de hasta 1.6 kg.

En los adultos el color del tronco es café oscuro; en el pecho y en el lomo tienen barras blancas o amarillentas intercaladas con café; el cuello y las mejillas son crema o blancuzcas. La cabeza es de color castaño oscuro, con un mechón de plumas que se extiende hacia atrás formando una corta cresta. Las alas y dorso son café oscuro, casi negros; la cola es blanco amarillenta por arriba y por abajo, con tenues líneas crema y una banda amplia



CANAL DE PANAMÁ

Vicepresidencia de Administración del
Recurso Hídrico (HI)
Unidad de Coordinación de la Comisión
Interinstitucional de la Cuenca
Hidrográfica (HI-CICH)

de color café en la punta. Tienen un área de piel de color rojiza o naranja que cubre la cara y el cere, en la que resaltan unos orificios nasales amplios. El pico es grueso, robusto, de color blanco hueso o grisáceo. La mandíbula superior es más ancha, larga y curvada hacia abajo, termina en una punta pronunciada en forma de gancho.



Las patas son largas, de color amarillo o naranja, aptas para caminar y correr sobre el suelo, terminan en garras largas y ganchudas, de color negro.

Las alas son largas, anchas y rectangulares, con las plumas de las puntas separadas como los dedos de una mano. En vuelo se ven 2 manchas blancas en las puntas de las alas.

Los juveniles son básicamente de color castaño claro con

tenues estrías verticales en canela, la corona café oscuro, las patas grises, el pico grisáceo y la cara rosada.

Distribución y hábitat

Es una especie natural de las Américas. Se encuentra desde el sur de los Estados Unidos, por toda Centroamérica, hasta el norte de Brasil y Perú, así como en algunas islas del Caribe como: Cuba, Aruba, Las Caimán y Trinidad y Tobago. Sin embargo, esta distribución no es continua; hay lugares donde su presencia es de común a abundante, mientras que en otros sitios es escasa a muy rara.

El hábitat preferido del carancho son las zonas abiertas, como: pastizales, sabanas, playones a orillas de los ríos, potreros, caminos rurales, matorrales abiertos y áreas agrícolas. Es menos común en zonas boscosas y en pantanos. En algunas ocasiones se les ve en vertederos de basura, muy poco se aventura a parques urbanos. Está presente desde el nivel del mar hasta los 2,600 metros de elevación.

En Panamá se encuentra con frecuencia en las tierras bajas de la vertiente del Pacífico, desde Chiriquí hasta el oeste de la provincia de Darién. Es muy raro verlo en la vertiente del Caribe, donde hay mayor cobertura boscosa. En la Cuenca del Canal es relativamente común en las áreas ganaderas que bordean el lago Gatún.

Alimentación y hábitos

Es un depredador más bien generalista. Sus estrategias para la obtención de alimentos son muy variadas. A diferencia de otras aves rapaces, sus desplazamientos son principalmente terrestres más que aéreos.

Se alimenta principalmente de carroña, siendo común observarlo a lo largo de los caminos y carreteras alimentándose de animales atropellados. En ocasiones se les puede ver junto a los gallinazos mientras comen de un animal muerto, aunque a veces pelean contra ellos, ahuyentándolos. Caza también pequeños animales como lagartijas, serpientes, ranas, ratones, etc. Para esto se posa sobre un poste, un arbusto o sobre un peñasco hasta localizar a su presa; luego desciende a tierra, a cierta distancia de dicha presa, para después alcanzarla caminando o a veces corriendo. Ataca principalmente a los animales jóvenes o heridos. En períodos de esca-

sez de comida, se les ha observado atacando a cerdos, terneros, corderos y cabritos recién nacidos, picoteándole los ojos, el ombligo y la región anal, aunque no hay certeza que les produzcan la muerte.

También puede atacar nidos de otras aves, comiéndose los huevos o los polluelos que hayan sido dejados sin vigilancia por sus padres. Escarba el suelo con sus garras en busca de semillas, frutos pequeños, lombrices y gusanos. Es hábil localizando nidos de tortugas y de iguanas, logrando desenterrar y comer los huevos más cercanos a la superficie. En ocasiones se le ve en los vertederos de basura, alimentándose de desechos orgánicos y de las larvas de insectos que proliferan entre los desperdicios. En los campos de labranza camina detrás de los tractores que están arando en busca de lombrices e insectos. Aprovecha cuando los animales en los potreros están descansando, se acerca a ellos y les quita las garrapatas.



El carancho tiene también otros hábitos alimenticios menos conocidos. Uno es caminar entre el fango en los manglares durante la marea baja en busca de crustáceos y pequeños peces. Otro es la piratería, ya que puede atacar a gaviotas y águilas pescadoras en vuelo, hasta obligarlas a soltar la presa, la cual luego atrapan antes que caiga a tierra.

Son principalmente sedentarios, muy territoriales, y se desplazan de acuerdo a la abundancia de alimento. Son solitarios, aunque pueden ser vistos en pareja o en pequeños grupos de 3 o 4 individuos, formados por los padres y los hijos juveniles Si encuentran un animal muerto de gran tamaño, podrían verse en grupos muy numerosos mientras comen.

Son principalmente sedentarios, muy territoriales, y se desplazan de acuerdo a la abundancia de alimento. Son solitarios, aunque pueden ser vistos en pareja o en pequeños grupos de 3 o 4 individuos, formados por los padres y los hijos juveniles Si encuentran un animal muerto de gran tamaño, podrían verse en grupos muy numerosos mientras comen.

Reproducción

Son generalmente monógamos, la unión de la pareja suele mantenerse por muchos años. Normalmente anidan en árboles altos, sin embargo, en áreas abiertas y perturbadas pueden elegir arbustos, matorrales o incluso peñascos enormes. El nido es voluminoso, puede medir 1 metro en diámetro, con una altura de 40 cm. Está formado por ramas entrelazadas en forma de copa, con el interior cubierto con plumas, hierbas, lana de ovejas, pelos y otros materiales suaves. Suelen usar el mismo nido por varios años, haciéndole algunos retoques cuando sean necesarios.

La nidada es de 2 a 3 huevos, raras veces 4, de color rojizo claro, manchados de castaño, midiendo de 54 a 59 mm. El periodo de incubación es de 28 a 32 días, durante los cuales ambos padres se turnan para incubar los huevos. Algunas parejas anidan por segunda vez durante el mismo año, en estos casos la nidada es de 1 a 2 huevos. Las crías empluman a las 7 u 8 semanas y empiezan a volar como aves independientes a los 3 meses.

Estado de conservación

El carancho era considerada una especie vulnerable en Panamá, pues aparecía en el listado nacional de especies amenazadas y endémicas, según la Resolución No. AG 51-2008, de la

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Sin embargo, ya no aparece en la lista las especies de flora y fauna en peligro presentada en la Resolución No. DM-0657-2016 del Ministerio de Ambiente.

En forma general está protegido por normas como: la Ley No. 24 de 1995 (Vida Silvestre), la Ley No. 39 de 2005 (Permisos de cacería y sanciones) y la Ley No. 5 de 2005 (Delitos Ambientales).

A nivel mundial la especie no se considera amenazada. En la revisión de octubre de 2016 de la lista roja de aves de la UICN, está catalogada como una especie de Menor Preocupación (LR). Fue sacada también del Apéndice II de CITES, en la versión de 2021.

Aunque es una especie que no está considerada en peligro inminente, podría llegar a estarlo si no se toman las medidas de protección apropiadas. En algunas partes, los ecosistemas están siendo drásticamente alterados debido a la expansión de los campos agrícolas y las zonas industriales y urbanas. También algunos granjeros los cazan o los envenenan porque los consideran una amenaza contra sus aves de corral. Otra de las causas de mortalidad es que al consumir animales muertos en las carreteras, en ocasiones es atropellado, sobre todo los individuos juveniles.

Otros datos

Hasta hace unos años, había sólo una especie reconocida, *Polyborus plancus*, pero recientemente fue dividida en 2 especies, las cuales fueron trasladadas al género *Caracara*. Las 2 especies son ahora: el carancho del norte (*Caracara cheriway*), cuya distribución ya se mencionó arriba, y el carancho del sur (*Caracara plancus*), que habita desde la región del Amazonas hasta la Tierra del Fuego. Ambas especies conviven en la región del río Amazonas.

Otros nombres comunes con que se conoce a esta especie en Panamá son: caracara crestado, caracara frentirrojo y garrapatero.

Referencias

1. Méndez, Pedro et. al. 2006. Las aves rapaces: Guía didáctica de educación ambiental. Fondo Peregrino - Panamá.
2. Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). Listado de las especies de fauna y flora amenazadas de Panamá. Resolución No. DM-0657-2016. Gaceta No_28187a_20161229.pdf
3. Ramírez Albores, J.E., T. Tinajero y L. Chapa Varhas. 2017. Cara a cara con el quebrantahuesos. CONA-BIO. Biodiversitas 130: 12-16.
4. Sociedad Audubon de Panamá. 2021. Lista de las aves de Panamá.
5. <https://panamabiota.org/stri/taxa/index.php?taxon=Caracara+cheriway&formsubmit=Search+Terms>
6. https://animaldiversity.org/accounts/Caracara_cheriway/
7. <http://www.bio-nica.info/biblioteca/RapacesColombia.pdf>
8. <https://cites.org/esp/app/index.php>
9. <http://greglasley.com/content/BirdsofNorthAmerica/CrestedCaracara.php>
10. https://ebird.org/species/y00678?siteLanguage=es_PA